ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N.

n.° 32.

2037

Je Soussigne commissaire Nommé par L'academie de chirurgie pour Examiner deux observations Envoiez par M. Dupernay chirurgien a Laval. il parle dans La premiere d'un homme agé de Soixante et cinq ans qui etoit atteint d'une verole bien confirmeé, et qui avoit pour Simptomes un chancre qui avoit Rongé La moitié du gland partie superieure et Laterale gauche accompagné d'un phimosis et d'une grande inflammation a La verge, suitte de gonorrhée virulente et de poulains de quinze ans de datte

Dans Le prelude de l'obsvation M. Dupernay se contredit formellement, car s'il y avoit un phimosis, il ne luy etoit pas possible de decouvrir Le chancre qu'il dit etre situé a la partie superieure du gland.

M. Dupernay persuadé que Les onctions Mercurielles etoit Le Seul Remede qui convint au malade pour La guerison, Ly prepara par Les saignez, purgations et Les Bains, et passa ensuitte aux frictions.

M. Dupernay ne dit point combien il donna de frictions, a quel Dose, La composition de son onguent, ny a quelle distance il Les a donné. il se contente de dire qu'au bout de trois semaines Le chancre qu'on frottoit deux fois Le jour du meme onguent, parut cicatrisé, et qu'il Le voioit

BIBLIOTHEQUE ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

AR C carton 34 n° 19

Le malade guerry quand il s'apperçut d'une sanie qui coulant par dessous la partie superieure du prepuce arrivoit a la fossette que formoit la cicatrice du gland m. Dupernay pour decouvrir le foyer de cette sanie introduisit dans le sinus qui la fournissoit une sonde qu'il poussa jusqu'au bout du sinus qui se terminoit au penil, il l'ouvrit dans toute sa longueur le long de la partie superieure de la verge, de maniere, dit il, que l'incision faite, laissa voir a decouvert les corps caverneux qui dans l'etat naturel selon luy semblent se cacher a la vue, leurs enveloppes leurs attaches a l'os ischion en forme d'y grec, et la membrane interne du prepuce, livide, et en partie sphacelée on introduisoit facilement le doigt entre les corps caverneux et l'urethre, tant la dilaceration etoit grande. m. Dupernay dit que par la suppuration les racines des corps caverneux, leurs membranes et enveloppes tomberent par lambeaux d'une consistence si dure qu'elles resistoient au tranchant du bistoury, de sorte que les corps caverneux n'aiants plus d'attaches aux os ischion, se racourcirent et se rangerent en un peloton a la racine du gland ou ils restent attachez representants une pyramide de figure et grosseur d'une cerise oblongue. enfin la playe bien mondifiée, m. Dupernay esperoit

une prompte et parfaitte cicatrice lorsquil perdit toute
esperance par Labord d'un pus abondant qui partoit,
dit il, des enfoncements formez dans les lobez du prepuce
ouvert ou on auroit caché plusieurs oeufs de pigeons.
pour lors M. Dupernay fit ce quil auroit du faire plustost,
qui fut d'appeller des consultans qui ayant sans doute appris
par le recit de ce chirurgien la maniere dont il avoit traité
le malade, j'entends le nombre des frictions, qui, ~~ce quil~~
~~ne~~ est ce quil ne nous dit pas et le peu de salivation qui
s'en etoit suivy, opinerent pour mettre le malade dans
les remedes, ce que L'on fit en le preparant de nouveau
et passant ensuitte a de nouvelles frictions ~~dont la~~
sixieme dont nous ignorons aussy les doses procura une
salivation abondante et un grand flux d'urine, et au
bout de 40 jours la plaie arriva a une cicatrice parfaitte
M. Dupernay finit en disant quil seroit curieuse et utile
de sçavoir si, pour corriger la difformité de la verge du
malade et accelerer la cicatrice de la plaie il auroit eté
possible d'emporter sans craindre d'hemoragie la
portion inutile des corps caverneux qui reste attaché a
la racine du gland, je crois quil ny auroit eu aucun
inconvenient, vu L'etat presque sphacelé de ces parties
puisquon fait souvent L'amputation de toute la verge
sans quil en arrive des accidents, il seroit donc a souhaitter
pour que L'observation pu servir a quelque chose que
M. Dupernay nous eclaircit sur les questions suivantes,
combien il a donné de frictions, a quelle dose, la composition

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

de son onguent, a quelle distance il les a donné tant dans le premier traitement que dans le second. La quantité de salivation et autres evacuations, combien de tems le malade a resté dans les linges, et enfin s'il n'y a aucune vice dans le cours des urines par la difformité de la verge.

La seconde observation parle d'un jeune homme de 22 ans qui pour une gonorrhée virulente receut un grand nombre de frictions sur les parties honteuses et qui sortant tous les jours dans cet etat par le conseil du chirurgien non titré qui le traitoit, fut attaqué de tremblement dans les lombes et dans les cuisses, suivis de goutte sereine et de mouvements epileptiques terminez au bout de trois semaines par la mort du malade a l'ouverture duquel M. Dupernay dit qu'il trouva les meninges enflammez, leurs vaisseaux et ceux du cerveau engorgez de sang et environ deux onces de serosité sanguinolente epanchez dans la cavité de l'occipital, tous ces accidents furent occasionnez sans doute par le mercure trop peu menagez a ce malade qui sortoit tous les jours sans observation.

Je pense que cette observation n'est pas d'une grande utilité n'etant point extraordinaire, et que l'academie n'en peut faire aucun usage.

a paris ce 10 fevrier 1740

[illegible]